

Rydym ond am i chi hela am oedolion yn yr arolwg hwn, gan nad oes gan falwod ifanc min cragen sydd wedi ei ffurfio'n llawn. Heb fin wedi ei ffurfio'n llawn ar gragen y falwen mae'n anodd bod yn siŵr at ba rywogaeth maent yn perthyn.

Mae adnabod y gwahaniaeth rhwng malwod ifanc ac aeddfed yn hawdd, mae dau beth allweddol i edrych amdano:

 Mae gan falwod aeddfed min wedi ei drychu o amgylch ymyl ceg y gragen sy'n troi ar ei fyny ychydig ar y pen. Mae gan gregyn malwod ifanc pen bregus heb ei drychu ar ddiwedd ceg y gragen.

 Mae gan falwod ifanc hollt ar waelod eu cragen o'r enw bogail nad oes gan rai aeddfed.

Mae malwod aeddfed yn fwy nag rhai ifanc, amrywia maint cragen yn arferol o 20-24mm ar draws ar gyfer *Cepaea nemoralis* aeddfed a 17-20mm ar draws ar gyfer *Cepaea hortensis* aeddfed.

Os na allwch ddweud os oes yw falwen benodol yn oedolyn neu'n ifanc, mae'n well i'w gadw allan o'ch sampl.

Cerwch at www.evolutionmegalab.org i ychwanegu eich data!

Cepaea Ifanc



Min y cragen heb ei drychu ac yn fregys

Bogail

Cepaea Aeddfed



Min y cragen wedi ei drychu a wedi ei troi at allan rywffaint

Dim bogail